


CHICKTONIC

HÁGALOS MÁS FUERTES

Premezcla líquida



Along with you

CHICKTONIC

Premezcla líquida

HÁGALOS MÁS FUERTES



CHICKTONIC es un complejo de vitaminas hidrosolubles, vitaminas liposolubles y aminoácidos en forma líquida para ser administrado en el agua de bebida.

Ingredientes	¿Cómo ayudan?
Vitaminas hidrosolubles: B ₁ , B ₂ , B ₅ , B ₆ , B ₇ y B ₁₂ . Colina.	Estimulan el apetito. Apoyan el metabolismo. Mantienen el rendimiento del sistema nervioso e inmune. La Biotina (B ₇) combate la pododermatitis causada por la cama húmeda. ¹
Vitaminas liposolubles: A, D ₃ , E, K.	Antioxidantes. La vitamina A protege la piel, los ojos, las vías respiratorias y la mucosa digestiva. La vitamina E aumenta el rendimiento reproductivo y estimula el sistema inmunitario. La vitamina D está implicada en el sistema óseo y muscular, así como en la calidad de la cáscara del huevo. La vitamina K es esencial para la correcta coagulación de la sangre.
Aminoácidos: Esenciales: Lis, Met, Arg, Cys, Gli, His. No esenciales: Glu, Ala, Asp, Pro, Ser.	Ayudan a lograr el máximo rendimiento en el crecimiento, la producción de huevos, la incubabilidad, la reproducción y las competiciones deportivas. ² La Lisina es esencial para el índice de conversión y el rendimiento de la pechuga. La Metionina y Cistina son clave para la formación de las plumas. La Treonina ayuda a mantener la integridad intestinal y la función inmune. La Treonina, Arginina, Prolina, Glicina y Serina a menudo no están presentes en cantidades suficientes en la dieta. ³



- **Producto completo y versátil:** contiene gran cantidad de vitaminas hidrosolubles, todas las vitaminas liposolubles y todos los aminoácidos esenciales para pollos de engorde,³ ponedoras y reproductoras.⁴

- **Solución homogénea que llega a todos los animales y no bloquea los nipples:** gracias a su solubilidad e hidrodispersabilidad.

- **Recomendado en animales que consumen poco alimento.**

CHICKTONIC es un soporte nutricional en situaciones difíciles.

Usos	Formas de uso
Para el arranque en los primeros días de vida	Pollitos/pollitas: 5-10 días Lechones destetados: 5 días Terminos lactantes: 5 días
Tratamientos antibióticos y parasitocidas	3 días durante y después
Vacunación	2 días antes y 3 días después
En picos de producción	Pollos de engorde en crecimiento: 5 días al mes Pico de postura: 7 días por mes Cerdos en crecimiento: 5 días por mes Cerdas lactantes: 5 días al inicio de la lactancia
En periodos de estrés (despique, transporte, tratamientos con rociador) y durante la convalecencia (para acelerar la recuperación del tejido)	3 días
En caso de deficiencias nutricionales y descenso de producción	3-5 días

Composición: 1 L contiene: Vitamina A, 2.500.000 UI; Vitamina D₃, 500.000 UI; Vitamina E, 3,75 g; Vitamina B₁, 3,5 g; Vitamina B₂, 4 g; Vitamina B₅ clorhidrato, 2 g; Vitamina B₁₂, 10 mg; D-Pantenol, 15 g; Vitamina K₃, 250 mg; Cloruro de colina, 400 mg; Biotina, 2 mg; DL-Metionina, 5 g; L-Lisina clorhidrato, 2,5 g; Hidrolizado de proteínas vegetales (que aporta: Lisina, Metionina, Ácido glutámico, Alanina, Arginina, Ácido aspártico, Cisteína, Glicina, Histidina, Isoleucina, Leucina, Fenilalanina, Prolina, Serina, Valina, Treonina, Triptófano y Tirosina), 45 g. **Indicaciones y especies de destino:** Bovino, caprino, equino, porcino, ovino y aves: corrige los estados carenciales y proporciona los elementos necesarios para que el crecimiento, el desarrollo y la producción de los animales sean completos. **Contraindicaciones, reacciones adversas e interacciones:** No se han descrito. **Dosis para cada especie, vía y método de administración:** Vía oral a través del agua de bebida. 1-2 ml/L de agua de bebida, durante 5-7 días. **Periodo de retiro:** no precisa. **Precauciones de almacenamiento:** Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños. Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz. **Otra información:** Envases de 1 L, 5 L y 25 L. Es posible que no se comercialicen todos los formatos. **Uso veterinario.**

DOSIS



Pollitos



Pollos de engorde



Ponedoras Reproductoras

1-2 ml/L de agua de bebida, durante 5-7 días.

Referencias

1. Vijayalakshmi, K., Virmani, M., Malik, R., Rajalakshmi, K., and Kasthuri, S. The Role of B Vitamins in Livestock Nutrition. J Vet Med Res 5(10): 1162. (2018)
2. Guoyao, W. Dietary requirements of synthesizable amino acids by animals: a paradigm shift in protein nutrition. J Anim Sci Biotechnol. 2014; 5(1): 34.
3. Belloir, P., Lessire, M., Berri C., Lambert, W., Corrent, E., and Tessaoud, S. Revisiting amino acid nutrition. 20th European Symposium on Poultry Nutrition. 24-27 August 2015. Prague, Czech Republic.
4. Nasr, J., Yaghoobfar, A., EbrahimNezhad, Y., and NazerAdl, K. Effects of amino acids and metabolizable energy on egg characteristics and broiler breeder performance. Afr J Biotechnol. Vol. 10(49), pp. 10066-10071, 2011