



Ficha Técnica

Superhion Uso Veterinario

Ectoparasiticida a base de Fipronil y Fluazurón para bovinos.

Producto Líquido

¡ALTO: Lea el inserto antes de usar el producto!

Composición:

Cada 100 mL contiene:

Fipronil 1,00 g

Fluazurón 3,00 g

Excipientes c.s.p. 100,00 mL

Indicaciones:

Superhion es un ectoparasiticida pour on para bovinos, compuesto por la asociación entre Fipronil (Fenilpirazole) y Fluazurón (Benzoilurea), indicado en el control estratégico de garrapatas y moscas de los cuernos, y para el tratamiento contra larvas y miasis.

Tratamiento en una sola dosis.

Parásitos para los cuales el uso de **Superhion** es indicado:

Garrapatas: *Rhipicephalus (Boophilus) microplus*.

Moscas: Moscas de los cuernos *Haematobia irritans*.

Larvas: Larvas de *Dermatobia hominis*.

Miasis: Larvas de *Cochliomyia hominivorax*.

Modo de utilización y dosificación:

Superhion se presenta en una forma líquida y transparente, incoloro a ligeramente amarillento que debe ser administrado por la vía tópica (pour on), con aplicación en toda la línea dorsal de los bovinos, del medio del cuello hasta el punto de inserción de la cola, en la dosis de 1 mL para cada 10 kg de peso corporal, según la tabla a continuación:

Dosificación correspondiente a 1 mg de Fipronil y a 3 mg de Fluazurón por kg de peso corporal.

El producto no deberá ser administrado en periodos con previsión de lluvias.

Contraindicaciones y restricciones:

No aplicar en terneros con edad inferior a 02 meses. No utilizar el producto en condiciones diferentes de las indicadas en el inserto. El producto no debe ser utilizado en animales que



presenten hipersensibilidad a Fipronil o Fluazurón. En los estudios clínicos realizados con el **Superhion**, el producto se mostró seguro para el tratamiento antiparasitario de los bovinos con edad superior a 02 meses.

Precauciones:

No administrar en animales con la piel lesionada. No dejar el producto en contacto con piensos de animales o alimentos almacenados. Cuando manipular el producto, utilizar equipos de protección individual (mono protector, máscara, guantes). Evitar el contacto prolongado con la piel y la inhalación del producto. Las manos deben ser lavadas después del manejo del producto. Si suceder contacto accidental con los ojos y la piel, lavar con abundante agua. En caso de ingestión accidental, no inducir vómito y consultar el médico. No utilizar el producto con fecha de validez vencida. Obedecer a las dosificaciones recomendadas para el uso del producto. Después de abierto, el producto deberá ser utilizando hasta 06 meses.

El fipronil puede afectar adversamente a los organismos acuáticos y a las abejas.

Interacciones medicamentosas:

El Fipronil actúa de forma sinérgica con amitraz (EMA, 2010), así como con la verbutina. Ocurre la antagonización de Fipronil cuando en uso concomitante con S, S, S-tributil fosforotritionato.

Reacciones adversas:

El producto utilizado en las dosificaciones indicadas no provoca reacciones adversas. Reacciones de hipersensibilidad individual pueden ocurrir. Para estos casos, es indicado el tratamiento sintomático.

Periodo de Retiro:

CARNE: No destinar al consumo humano la carne de animales tratados antes de transcurridos 54 días tras la última aplicación.

LECHE: Este producto no debe ser aplicado en hembras productoras de leche para el consumo humano.

Informaciones para uso médico:

El mecanismo de acción de la toxicidad de Fipronil ocurre por la inhibición en el receptor GABA. Los signos clínicos en humanos son generalmente en el SNC, pero son reversibles y se resuelven espontáneamente. La ingestión del Fluazuron puede causar irritación gastrointestinal y depresión en el sistema nervoso central. No hay antídoto para estos activos. El tratamiento debe ser sintomático.

Conservar en lugar seco y fresco, en temperatura entre 15°C y 30°C, al abrigo de la luz solar directa.



No almacenar en casa de habitación.

Manténgase alejado de los niños, animales y alimentos.

DESCARTAR LOS ENVASES VACÍOS Y RESTOS DE PRODUCTO SIGUIENDO LA REGLAMENTACIÓN NACIONAL EN VIGOR.

VENTA BAJO RECETA Y ADMINISTRACIÓN BAJO ORIENTACIÓN DEL MÉDICO VETERINARIO.
En Ecuador: Venta libre

EN CASO DE INTOXICACIÓN CONSULTE AL MÉDICO Y ENTREGUELE EL INSERTO

Centro Nacional de Control de Intoxicaciones de Costa Rica: 2223-1028

Recomendaciones para protección ambiental: No contaminar ríos u otros cursos de agua.

Responsable Técnica:

Dra. Caroline Della Nina Pistoni
CRMV/SP 24.508.

Importado y distribuido por:

Bolivia: SENASAG Reg. PUV – N.º 008091/17 – Servi-Insumos Bolivia Import Export SRL. – Santa Cruz de la Sierra, Bolivia / **Costa Rica:** Reg.: MAG MV-6432 / **Ecuador:** Reg. RIP-02-FAR-00070 AGROCALIDAD – PRODUCTOS NUTRICIÓN Y SERVICIOS PRONUTROS CIA. LTDA – Gaspar de Escalona N39-29 y Granda Centeno, Quito, Ecuador / **Guatemala:** Reg. BR211-43-02-8180 / **Honduras:** Reg. MV-3655 / **Nicaragua:** Reg. MV – 11101 / **Panamá:** Reg. MV – 8393 / **Paraguay:** Reg. SENACSA N° 18.502 – Agroveterinaria Provet de Manuel Carvallo Hab. N: 894. Direc.Tec.: Dr. Manuel Carvallo. Reg.Prof.429. / **Perú:** Reg. SENASA F.087.037.I.00597 – INVERSIONES NORVET S.A.C. – Jr. José de la Torre Ugarte N° 368, Oficina 203, Lince. Lima – Perú.

Proprietario y Fabricante:

Ourofino Saúde Animal Ltda.

Rod. Anhanguera SP 330, km 298

CEP: 14140 000 Cravinhos SP

CNPJ: 57.624.462/0001-05

Tel/Fax: 55 16 3518 2025

www.ourofino.saudeanimal.com

Hecho en Brasil