


SPIROVAC L5

Uso veterinario. Material para uso exclusivo del médico veterinario.

BACTERINA DE LEPTOSPIRA CANICOLAGRIPPOTYPHOSA-HARDJO-ICTEROHAEMORRHAGIA-EPOMONA



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Spirovac L5 es una bacterina que contiene una cepa, especialmente preparada, inactivada y adyuvada de *Leptospira borgpetersenii*, variedad serológica hardjo-bovis con cultivos inactivados de *L. pomona*, *L. grippotyphosa*, *L. canicola* y *L. icterohaemorrhagiae*.

INDICACIONES

Spirovac L5 es para la vacunación de ganado sano, incluyendo vacas gestantes y vaquillas; becerros mayores de 4 semanas de edad, como una ayuda en la prevención de las enfermedades causadas por los organismos antes citados. Además, está especialmente indicado para prevenir la colonización renal con *L. hardjo* y la consiguiente presencia de bacterias en la orina, por un período mínimo de 12 meses. Spirovac L5 también evita que la *L. hardjo* infecte el tracto genital y ayuda en la prevención de la infección en el feto.



PRESENTACION

Frascos 20 ml

10 dosis

USO EN



GANADO
EN PASTOREO

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Subcutánea o Intramuscular

Direcciones Generales:

Recomendada para la vacunación de ganado sano incluyendo vacas gestantes y vaquillas. Agitar bien. Administre asépticamente 2 mL por vía subcutánea o intramuscular en la región superior del cuello.

Vacunación primaria: El ganado sano debe recibir 2 dosis, administradas con un intervalo de 4 a 6 semanas entre cada una, y dosis de refuerzo cuando se considere necesario. Cuando es usada como una ayuda en la prevención de la infección genital o fetal, la dosis de refuerzo debe ser administrada por lo menos 2 semanas antes del servicio. La vacunación primaria con este producto en becerros de 4 semanas de edad, con una segunda dosis administrada 4 a 6 semanas después, previene la infección, colonización y subsecuente excreción de la variedad serológica hardjo-bovis, una fuente de infección para el hato.

Revacunación: Se recomienda la revacunación anual usando una sola dosis. Incluir a todos los toros en el programa de vacunación. Como parte de los procedimientos normales de bioseguridad, todos los animales de reemplazo deberán comenzar con el programa de administración de dos dosis de vacuna al incorporarse al hato. La vacuna deberá usarse de conformidad con las buenas prácticas de cría de animales y control de la salud del ganado.

SPIROVAC L5

Uso veterinario. Material para uso exclusivo del médico veterinario.

BACTERINA DE LEPTOSPIRA CANICOLA GRIPPOTYPHOSA-HARDJO-ICTEROHAEMORRHAGIA-EPOMONA

INSTRUCCIONES/ADVERTENCIAS



Una vez abierto use todo el contenido.



Para administrar esta vacuna, deberán utilizarse jeringas y agujas esterilizadas.



No vacunar 21 días antes del sacrificio.



Contiene mertiolate como conservador. Contiene gel de hidróxido de aluminio como adyuvante.



Consulte al Médico Veterinario.



Como con otras vacunas, la anafilaxis puede ocurrir después de la administración de este producto. En caso de reacciones anafilácticas se recomienda el uso de epinefrina como antídoto inicial y seguida de una terapia de soporte adecuada.



Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.



Se ha demostrado que este producto es eficaz en animales sanos.

ALMACENAMIENTO



Almacenar entre 2° y 7°C. La exposición prolongada a temperaturas más elevadas y/o a la luz directa del sol puede afectar adversamente la potencia.



Disponer de los envases vacíos de acuerdo con las regulaciones locales.



No congelar.

FABRICANTE

Elaborado por: Zoetis Inc.,
601 West Cornhusker Highway,
Lincoln, Nebraska 68521,
Estados Unidos. VLN 190.